PROTOCOLLO 49

Rilascio miofasciale della fascia temporale

Migliorare la mobilità dei tessuti del distretto temporale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, cefalea	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Tessuti tesi e poco mobili
- ✓ Cefalea tensiva
- ✓ Sensibilità diffusa

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino.

Fisioterapista: alla testa del lettino, mani a piatto sulle tempie.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto

Mani a piatto sulle tempie, pressione minima.



Ascolto

Percepisci la direzione di restrizione.



Mantenimento

Segui il tessuto fino al rilascio.



Conclusione

Rilascia gradualmente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	90 a 120 secondi
Pressione	minima
Ripetizioni	1 o 2

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Pressione leggera e costante
- ✓ Ritmo lento
- ✓ Ambiente tranquillo

Errori da evitare

- ! Forzare il tessuto
- ! Fretta
- ! Mani tese

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio dolce	Scivolamento lento con i palmi sulle tempie	2 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Le tecniche miofasciali dolci sono utili nei pazienti con sensibilizzazione e scarsa tolleranza alla pressione.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.