PROTOCOLLO 55

Apertura con lingua al palato

Limitare la traslazione eccessiva e favorire la rotazione condilare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipermobilità o click
- ✓ Deviazione in apertura
- ✓ Fase iniziale del controllo motorio

Controindicazioni e precauzioni


- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Punta della lingua sul palato dietro gli incisivi.



Apertura

Apri lentamente mantenendo il contatto della lingua.



Limite

Fermati quando la lingua tende a staccarsi.



Chiusura

Chiudi lentamente senza contatto forte dei denti.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Velocità	lenta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il movimento deve essere retto allo specchio
- ✓ Nessun click durante l'esercizio
- ✓ Rilassa le labbra

Errori da evitare

- ! Staccare la lingua
- ! Aprire con scatti
- ! Serrare i denti alla chiusura

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura controllata	Apertura con lingua al palato davanti allo specchio	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'esercizio riduce la traslazione eccessiva ed è la base per il controllo del click.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.