PROTOCOLLO 57

Coordinazione in lateralità

Migliorare il controllo dei movimenti laterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Lateralità asimmetrica
- ✓ Dolore in masticazione
- ✓ Scarso controllo motorio

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Denti leggermente separati, lingua rilassata.



Movimento

Scivola la mandibola lentamente verso un lato.



Ritorno

Ritorna al centro controllando il movimento.



Alternanza

Ripeti verso l'altro lato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10 per lato
Serie	2 al giorno
Velocità	lenta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Usa un abbassalingua per guidare il movimento
- ✓ Simmetria dei due lati
- ✓ Senza dolore

Errori da evitare

- ! Aprire troppo la bocca
- ! Movimento a scatti
- ! Contrarre il collo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Lateralità guidata	Movimenti laterali lenti con abbassalingua tra gli incisivi	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La coordinazione laterale prepara alla masticazione bilaterale.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.