PROTOCOLLO 62

Esercizi contro resistenza progressiva

Recuperare forza e resistenza dei muscoli masticatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta tardiva e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Fase finale del recupero
- ✓ Ritorno alla dieta normale
- ✓ Debolezza muscolare

Controindicazioni e precauzioni


- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riscaldamento

Aperture attive lente.



Resistenza

Elastico morbido o mano come resistenza.



Movimenti

Apertura, lateralità e protrusione contro resistenza lieve.



Progressione

Aumenta le ripetizioni prima della resistenza.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10 a 15
Serie	2
Frequenza	1 volta al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Progressione graduale
- ✓ Monitora la risposta nelle 24 ore
- ✓ Senza dolore

Errori da evitare

- ! Carichi elevati
- ! Progressione rapida
- ! Uso in fase acuta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Resistenza leggera	Apertura contro la mano con resistenza lieve	10 ripetizioni, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** Il carico progressivo prepara i tessuti alle richieste della vita quotidiana.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.