
MODULO I · GRAVIDANZA · ESERCIZIO 02

# CONSAPEVOLEZZA DEL PAVIMENTO PELVICO DA SEDUTA



| Posizione | Dosaggio | Frequenza | Livello |
|---|---|---|---|
| Seduta su fitball o sedia | 10 ripetizioni | 2 volte al giorno | Base |

## 1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Migliorare la percezione del pavimento pelvico usando il contatto della seduta come riferimento sensoriale.

## 2. INDICAZIONE CLINICA

Gestanti con scarsa consapevolezza perineale o difficoltà a distinguere contrazione e rilascio.

## 3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi sulla fitball con i piedi appoggiati a terra e le ginocchia alla larghezza del bacino.
2. Senti il contatto delle tuberosità ischiatiche e del perineo con la palla.
3. Espirando, solleva delicatamente il perineo dalla superficie della palla, senza stringere i glutei.
4. Mantieni per 3 secondi, poi rilascia lentamente e senti il perineo tornare in appoggio.
5. Fai una pausa di un respiro completo prima della ripetizione successiva.

## 4. PROGRESSIONE

Alterna 5 contrazioni lente a 5 contrazioni rapide di un secondo.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Un asciugamano arrotolato sulla sedia, in senso antero posteriore, aumenta il feedback sensoriale se la fitball non è disponibile.

## 5. PRECAUZIONI

*In gravidanza gli esercizi vanno proposti solo con il nulla osta del ginecologo o dell'ostetrica. Dopo la 20ª settimana evitare di mantenere a lungo la posizione supina. Interrompere subito in caso di perdite di sangue o di liquido, contrazioni regolari, capogiri, dolore addominale o pelvico, riduzione dei movimenti fetali.*