
MODULO I · GRAVIDANZA · ESERCIZIO 07

CLAM SHELL IN DECUBITO LATERALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Decubito laterale	10 a 12 ripetizioni per lato	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Rinforzare il medio gluteo e i rotatori esterni dell'anca per migliorare la stabilità del bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Gestanti con dolore al cingolo pelvico, instabilità del bacino o debolezza dei glutei.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati sul fianco con un cuscino sotto la testa e uno sotto la pancia, ginocchia piegate e piedi uniti.
2. Espirando, attiva il pavimento pelvico e solleva il ginocchio superiore mantenendo i piedi a contatto.
3. Non ruotare il bacino all'indietro durante il movimento.
4. Inspirando, riporta lentamente il ginocchio in posizione.
5. Completa la serie e cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Aggiungi un elastico leggero sopra le ginocchia.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Un cuscino tra le ginocchia nella fase di riposo riduce il carico sulla sinfisi pubica.

5. PRECAUZIONI

In gravidanza gli esercizi vanno proposti solo con il nulla osta del ginecologo o dell'ostetrica. Dopo la 20ª settimana evitare di mantenere a lungo la posizione supina. Interrompere subito in caso di perdite di sangue o di liquido, contrazioni regolari, capogiri, dolore addominale o pelvico, riduzione dei movimenti fetali.