
MODULO I · GRAVIDANZA · ESERCIZIO 08

ALLUNGAMENTO DEI FLESSORI DELL'ANCA IN GINOCCHIO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
In ginocchio, un piede avanti	3 respiri lenti, 3 volte per lato	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare l'ileopsoas e ridurre l'iperlordosi tipica della gravidanza.

2. INDICAZIONE CLINICA

Gestanti con lombalgia, iperlordosi o rigidità della parte anteriore dell'anca.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in ginocchio su un tappetino, porta un piede in avanti con il ginocchio a 90 gradi.
2. Appoggia le mani sulla coscia anteriore o su una sedia per l'equilibrio.
3. Espirando, porta il bacino in leggera retroversione e attiva delicatamente il perineo.
4. Avanza leggermente con il bacino fino a sentire l'allungamento davanti all'anca posteriore.
5. Mantieni respirando, poi cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Solleva il braccio del lato posteriore verso l'alto per estendere l'allungamento al fianco.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il bacino in retroversione rende l'allungamento efficace con un movimento minimo: non serve avanzare molto.

5. PRECAUZIONI

In gravidanza gli esercizi vanno proposti solo con il nulla osta del ginecologo o dell'ostetrica. Dopo la 20ª settimana evitare di mantenere a lungo la posizione supina. Interrompere subito in caso di perdite di sangue o di liquido, contrazioni regolari, capogiri, dolore addominale o pelvico, riduzione dei movimenti fetali.