
MODULO I · GRAVIDANZA · ESERCIZIO 10

RILASSAMENTO DEL PERINEO IN DECUBITO LATERALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Decubito laterale sinistro	10 respiri	1 volta al giorno, anche la sera	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allenare il rilascio consapevole del pavimento pelvico in una posizione di riposo.

2. INDICAZIONE CLINICA

Gestanti nel terzo trimestre, ipertono perineale, preparazione alla fase espulsiva.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati sul fianco sinistro con un cuscino sotto la testa, uno tra le ginocchia e uno sotto la pancia.
2. Porta l'attenzione al respiro e al movimento delle coste.
3. Inspirando, immagina che il perineo si allarghi e si ammorbidisca.
4. Espirando, lascia andare la mandibola, le spalle e i glutei.
5. Prosegui per alcuni minuti con un ritmo lento.

4. PROGRESSIONE

Aggiungi una visualizzazione guidata del momento del parto.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il rilassamento della mandibola si associa spesso a quello del perineo: usalo come istruzione verbale.

5. PRECAUZIONI

In gravidanza gli esercizi vanno proposti solo con il nulla osta del ginecologo o dell'ostetrica. Dopo la 20ª settimana evitare di mantenere a lungo la posizione supina. Interrompere subito in caso di perdite di sangue o di liquido, contrazioni regolari, capogiri, dolore addominale o pelvico, riduzione dei movimenti fetali.