MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 01

RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA IN POSIZIONE SUPINA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 respiri	2 o 3 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Ristabilire la coordinazione tra diaframma, addome e pavimento pelvico dopo il parto.

2. INDICAZIONE CLINICA

Primi giorni dopo il parto vaginale o cesareo, ripresa della consapevolezza corporea.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati.
2. Appoggia una mano sul petto e una sull'addome.
3. Inspira dal naso lasciando espandere addome e coste in modo morbido.
4. Espira lentamente dalla bocca sentendo l'addome e il perineo che tornano verso l'interno.
5. Mantieni un ritmo calmo, senza forzare.

4. PROGRESSIONE

Aggiungi una leggera attivazione perineale nella seconda metà dell'espirazione.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Dopo il cesareo appoggia un cuscino sulla ferita: la pressione delicata riduce il fastidio durante la respirazione.

5. PRECAUZIONI

Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.