MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 02

ATTIVAZIONE DEL TRASVERSO ADDOMINALE CON ESPIRAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 ripetizioni da 5 secondi	2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Riattivare il trasverso addominale in sinergia con il pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Post partum precoce, diastasi dei retti, debolezza del core.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate e la colonna in posizione neutra.
2. Appoggia le dita appena all'interno delle spine iliache anteriori.
3. Espirando, attiva il perineo e senti il basso ventre che si appiattisce sotto le dita.
4. Mantieni per 5 secondi respirando normalmente.
5. Rilascia completamente e riposa un respiro.

4. PROGRESSIONE

Mantieni per 10 secondi e passa alla posizione seduta.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> L'attivazione deve essere leggera, circa il 30 per cento: se l'addome si gonfia o il bacino si muove, l'intensità è eccessiva.

5. PRECAUZIONI

Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.