MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 03

BASCULAMENTO PELVICO DA SUPINA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 ripetizioni	2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Recuperare la mobilità lombopelvica e il controllo della muscolatura addominale profonda.

2. INDICAZIONE CLINICA

Lombalgia post partum, rigidità del bacino, primo approccio al lavoro addominale.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate e le braccia lungo il corpo.
2. Espirando, attiva il perineo e porta il bacino in retroversione appiattendo la zona lombare.
3. Mantieni per 2 o 3 secondi.
4. Inspirando, riporta il bacino in posizione neutra e rilascia il perineo.
5. Esegui movimenti piccoli e controllati.

4. PROGRESSIONE

Esegui lo stesso esercizio seduta su fitball.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Evita di spingere con i piedi o di contrarre i glutei: il movimento nasce dagli addominali profondi.

5. PRECAUZIONI

Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.