
MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 07

DEAD BUG MODIFICATO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, gambe a tavolino	6 a 8 ripetizioni per lato	1 volta al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Rinforzare la muscolatura addominale profonda mantenendo stabile la colonna.

2. INDICAZIONE CLINICA

Post partum avanzato, diastasi in recupero con buon controllo, ritorno all'attività fisica.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina, porta le ginocchia sopra le anche a 90 gradi e le braccia verso il soffitto.
2. Espirando, attiva perineo e trasverso.
3. Abbassa lentamente un tallone verso il pavimento e il braccio opposto dietro la testa.
4. Inspirando, torna alla posizione iniziale.
5. Alterna i lati senza inarcare la schiena.

4. PROGRESSIONE

Distendi completamente la gamba mantenendola a pochi centimetri dal pavimento.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Se compare la cupola addominale o la schiena si inarca, appoggia il tallone a terra e riduci il braccio di leva.

5. PRECAUZIONI

Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.