MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 08

# CLAM SHELL IN DECUBITO LATERALE



| Posizione | Dosaggio | Frequenza | Livello |
|---|---|---|---|
| Decubito laterale | 12 ripetizioni per lato | 1 volta al giorno | Base |

## 1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Rinforzare i rotatori esterni e il medio gluteo per la stabilità del bacino.

## 2. INDICAZIONE CLINICA

Post partum, instabilità del cingolo pelvico, debolezza glutea.

## 3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati sul fianco con le ginocchia piegate e i piedi uniti.
2. Espirando, attiva il perineo e apri il ginocchio superiore come una conchiglia.
3. Mantieni i piedi a contatto e il bacino fermo.
4. Inspirando, chiudi lentamente.
5. Completa la serie e cambia lato.

## 4. PROGRESSIONE

Aggiungi un elastico sopra le ginocchia o una tenuta di 3 secondi in apertura.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Appoggia la mano superiore sulla cresta iliaca per percepire se il bacino ruota.

## 5. PRECAUZIONI

*Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.*