MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 09

GATTO E MUCCA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Quadrupedia	8 a 10 cicli	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Mobilizzare la colonna e coordinare respiro, addome e pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Rigidità dorsale e lombare legata all'allattamento e al trasporto del neonato.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in quadrupedia con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche.
2. Espirando, arrotonda la schiena e attiva il perineo.
3. Inspirando, estendi delicatamente la colonna e rilascia il perineo.
4. Muoviti lentamente seguendo il respiro.
5. Termina in posizione neutra.

4. PROGRESSIONE

Aggiungi una rotazione toracica portando una mano verso il soffitto.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Ottimo esercizio da proporre dopo le poppate, per ridurre la cifosi dovuta alla posizione di allattamento.

5. PRECAUZIONI

Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.