
MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 10

# SQUAT A CORPO LIBERO CON ESPIRAZIONE



| Posizione | Dosaggio | Frequenza | Livello |
|---|---|---|---|
| In piedi | 10 ripetizioni | 1 volta al giorno | Intermedio |

## 1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Rinforzare gli arti inferiori integrando il pavimento pelvico in un gesto quotidiano.

## 2. INDICAZIONE CLINICA

Post partum avanzato, ritorno alle attività con il neonato in braccio.

## 3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. In piedi, con i piedi alla larghezza delle spalle e le braccia in avanti.
2. Inspirando, scendi spingendo il bacino indietro come per sederti.
3. Mantieni il peso sui talloni e le ginocchia in linea con i piedi.
4. Espirando, attiva il perineo e risali.
5. Esegui il movimento in modo lento e controllato.

## 4. PROGRESSIONE

Aggiungi un carico leggero tenuto vicino al petto.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La regola da insegnare è semplice: espira sullo sforzo. Il perineo si attiva mentre si sale, non mentre si scende.

## 5. PRECAUZIONI

*Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.*