MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 02

CONTRAZIONI LENTE E RAPIDE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	8 lente da 5 a 10 secondi e 10 rapide	3 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allenare sia la resistenza (fibre lente) sia la reattività (fibre rapide) del pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Incontinenza urinaria da sforzo e mista, debolezza del pavimento pelvico.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Esegui una contrazione lenta: solleva il perineo e mantieni per 5 secondi, respirando.
3. Rilascia per un tempo uguale alla tenuta.
4. Dopo le contrazioni lente esegui 10 contrazioni rapide di un secondo, con rilascio completo tra l'una e l'altra.
5. Registra il numero di ripetizioni eseguite correttamente.

4. PROGRESSIONE

Aumenta la tenuta fino a 10 secondi e passa alla posizione seduta e poi in piedi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il rilascio completo tra le contrazioni è parte dell'esercizio: senza rilascio la contrazione successiva perde qualità.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.