
MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 03

CONTRAZIONI PROLUNGATE DA SEDUTA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta	8 ripetizioni da 6 a 10 secondi	3 volte al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Aumentare la resistenza del pavimento pelvico contro la gravità.

2. INDICAZIONE CLINICA

Incontinenza da sforzo in fase di progressione.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi su una sedia con la schiena dritta e i piedi appoggiati.
2. Senti l'appoggio del perineo sulla seduta.
3. Contrai sollevando il perineo dalla sedia e mantieni respirando.
4. Rilascia lentamente per lo stesso tempo.
5. Ripeti mantenendo glutei e addome rilassati.

4. PROGRESSIONE

Esegui l'esercizio durante attività quotidiane da seduta, come al computer o in auto.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Una posizione con il busto leggermente inclinato in avanti facilita la percezione della parte anteriore del pavimento pelvico.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.