MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 04

CONTRAZIONI IN STAZIONE ERETTA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
In piedi	8 lente e 10 rapide	3 volte al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allenare il pavimento pelvico nella posizione in cui si verificano più spesso le perdite.

2. INDICAZIONE CLINICA

Incontinenza da sforzo, fase di trasferimento funzionale.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. In piedi con i piedi alla larghezza del bacino e le ginocchia morbide.
2. Esegui una contrazione lenta mantenendo per 5 a 10 secondi.
3. Rilascia completamente.
4. Prosegui con le contrazioni rapide.
5. Mantieni la postura senza contrarre glutei e addome superficiale.

4. PROGRESSIONE

Esegui le contrazioni con il peso su una sola gamba.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Proponi la sequenza in momenti fissi della giornata, ad esempio mentre si lavano i denti, per favorire l'aderenza.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.