
MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 06

PONTE CON PALLA TRA LE GINOCCHIA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 ripetizioni	1 volta al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Integrare adduttori, glutei e pavimento pelvico per aumentare la sinergia muscolare.

2. INDICAZIONE CLINICA

Incontinenza da sforzo, debolezza della catena posteriore.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con una palla morbida tra le ginocchia.
2. Espirando, stringi la palla, attiva il perineo e solleva il bacino.
3. Mantieni per 3 a 5 secondi.
4. Inspirando, scendi lentamente e rilascia.
5. Riposa un respiro.

4. PROGRESSIONE

Mantieni in alto e aggiungi 3 contrazioni rapide prima di scendere.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La compressione della palla facilita il reclutamento del pavimento pelvico nelle pazienti che faticano ad attivarlo da solo.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.