
MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 07

ALZARSI DALLA SEDIA CON PRECONTRAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta, poi in piedi	10 ripetizioni	1 volta al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Trasferire la precontrazione del pavimento pelvico in un gesto funzionale quotidiano.

2. INDICAZIONE CLINICA

Perdite urinarie nel passaggio da seduta a in piedi.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi sul bordo di una sedia con i piedi appoggiati.
2. Porta il busto in avanti mantenendo la schiena lunga.
3. Espirando, attiva il perineo e alzati spingendo con le gambe.
4. Risiediti lentamente controllando la discesa.
5. Ripeti senza aiutarti con le mani, se possibile.

4. PROGRESSIONE

Usa una sedia più bassa o tieni un peso leggero tra le mani.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Molte perdite avvengono proprio nei passaggi posturali: osserva il gesto della paziente prima di correggerlo.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.