MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 08

ADDUZIONE DELLE ANCHE CON PALLA DA SUPINA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 ripetizioni da 5 secondi	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Facilitare il reclutamento del pavimento pelvico attraverso la co attivazione degli adduttori.

2. INDICAZIONE CLINICA

Pazienti con contrazione debole o difficile da percepire.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate e una palla morbida tra le ginocchia.
2. Espirando, stringi la palla e contrai il perineo.
3. Mantieni per 5 secondi respirando.
4. Rilascia completamente palla e perineo.
5. Ripeti con un ritmo lento.

4. PROGRESSIONE

Esegui la stessa sequenza da seduta.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Riduci gradualmente la forza sulla palla, finché la paziente riesce ad attivare il perineo senza l'aiuto degli adduttori.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.