
MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 10

TECNICA DI SOPPRESSIONE DELL'URGENZA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta o in piedi, ferma	5 contrazioni rapide	Al bisogno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Insegnare a controllare lo stimolo urgente senza correre al bagno.

2. INDICAZIONE CLINICA

Incontinenza da urgenza e mista, vescica iperattiva.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Quando arriva lo stimolo, fermati e resta immobile, meglio se seduta.
2. Esegui 5 contrazioni rapide e forti del pavimento pelvico.
3. Respira lentamente e distrai l'attenzione, ad esempio contando all'indietro.
4. Attendi che lo stimolo si riduca.
5. Solo allora raggiungi il bagno camminando con calma.

4. PROGRESSIONE

Aumenta progressivamente l'intervallo tra le minzioni di 15 minuti alla volta.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Associa la tecnica al diario minzionale e a un programma di allenamento vescicale con intervalli progressivi.

5. PRECAUZIONI

Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.