MODULO III · INCONTINENZA URINARIA · ESERCIZIO 11

# MARCIA CON PRECONTRAZIONE E RESPIRAZIONE



| Posizione | Dosaggio | Frequenza | Livello |
|---|---|---|---|
| In piedi | 1 o 2 minuti | 1 volta al giorno | Avanzato |

## 1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Integrare il pavimento pelvico in un'attività dinamica con impatto ridotto.

## 2. INDICAZIONE CLINICA

Fase avanzata del programma per l'incontinenza da sforzo, preparazione al ritorno allo sport.

## 3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. In piedi, attiva leggermente il pavimento pelvico.
2. Marcia sul posto sollevando le ginocchia.
3. Respira in modo continuo, senza apnea.
4. Ogni 10 passi esegui una contrazione rapida più intensa.
5. Interrompi se compare una perdita e annotala.

## 4. PROGRESSIONE

Passa a piccoli saltelli o alla salita sui gradini.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La comparsa di perdite indica il livello di carico non ancora tollerato: usala per dosare la progressione.

## 5. PRECAUZIONI

*Prima di proporre il programma verificare con una valutazione che la paziente esegua correttamente la contrazione, senza spinta verso il basso. In presenza di urgenza con dolore, ematuria, febbre o infezioni ricorrenti, inviare al medico.*