MODULO IV · DOLORE PELVICO · ESERCIZIO 01

RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA CON RILASSAMENTO PERINEALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 respiri	2 o 3 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Ridurre la tensione del pavimento pelvico e il tono del sistema nervoso simpatico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dolore pelvico cronico, vulvodinia, dispareunia, sindrome del dolore vescicale.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con un cuscino sotto le ginocchia.
2. Appoggia le mani sull'addome.
3. Inspira lentamente dal naso lasciando espandere addome e coste e immagina il perineo che si allarga.
4. Espira dalla bocca in modo lungo e morbido, senza contrarre.
5. Prosegui per alcuni minuti.

4. PROGRESSIONE

Allunga l'espirazione fino al doppio della durata dell'inspirazione.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Nel dolore pelvico l'obiettivo non è la forza: ogni istruzione deve orientare al rilascio.

5. PRECAUZIONI

Nel dolore pelvico persistente è necessaria una diagnosi medica: escludere cause ginecologiche, urologiche, intestinali o infettive. Gli esercizi non devono aumentare il dolore: lavorare sempre in un'ampiezza confortevole.