
MODULO IV · DOLORE PELVICO · ESERCIZIO 06

ALLUNGAMENTO DEI FLESSORI DELL'ANCA IN GINOCCHIO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
In ginocchio, un piede avanti	30 secondi per lato, 2 volte	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Ridurre la tensione dell'ileopsoas, spesso associata al dolore pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dolore pelvico anteriore, dolore inguinale, posture sedentarie prolungate.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in ginocchio e porta un piede in avanti.
2. Porta il bacino in leggera retroversione.
3. Avanza leggermente con il bacino fino a sentire l'allungamento.
4. Respira lentamente mantenendo la posizione.
5. Cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Solleva il braccio dal lato posteriore e inclina lievemente il busto.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Metti un cuscino sotto il ginocchio posteriore per evitare la pressione sulla rotula.

5. PRECAUZIONI

Nel dolore pelvico persistente è necessaria una diagnosi medica: escludere cause ginecologiche, urologiche, intestinali o infettive. Gli esercizi non devono aumentare il dolore: lavorare sempre in un'ampiezza confortevole.