
MODULO IV · DOLORE PELVICO · ESERCIZIO 07

ALLUNGAMENTO DEL PIRIFORME



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina	30 secondi per lato, 2 volte	1 o 2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Ridurre la tensione del piriforme e dei rotatori dell'anca, in stretto rapporto con il pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dolore pelvico posteriore, dolore gluteo, sindrome del piriforme, ipertono del pavimento pelvico.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Appoggia la caviglia destra sul ginocchio sinistro.
3. Afferra la coscia sinistra e avvicinala al petto.
4. Respira lentamente sentendo l'allungamento nel gluteo destro.
5. Mantieni e poi cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Esegui la stessa posizione da seduta sulla sedia, con il busto inclinato in avanti.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Se è difficile afferrare la coscia, usa un asciugamano o una cintura dietro il ginocchio.

5. PRECAUZIONI

Nel dolore pelvico persistente è necessaria una diagnosi medica: escludere cause ginecologiche, urologiche, intestinali o infettive. Gli esercizi non devono aumentare il dolore: lavorare sempre in un'ampiezza confortevole.