MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 01

RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA CON ALLUNGAMENTO PERINEALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 respiri	2 o 3 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Insegnare il rilascio del pavimento pelvico sincronizzato con l'inspirazione.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono del pavimento pelvico, vaginismo, dispareunia, stipsi da defecazione ostruita.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate e un cuscino sotto le ginocchia.
2. Inspira lentamente e immagina il perineo che scende e si allarga, come un fiore che si apre.
3. Espira lasciando che il perineo ritorni spontaneamente, senza contrarlo.
4. Mantieni mandibola, spalle e glutei rilassati.
5. Prosegui per alcuni minuti.

4. PROGRESSIONE

Esegui la stessa respirazione da seduta e poi in piedi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Usa immagini semplici e concrete: l'ascensore che scende di un piano, l'ombrello che si apre.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.