
MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 02

REVERSE KEGEL: RILASCIO ATTIVO DEL PAVIMENTO PELVICO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta	8 a 10 ripetizioni	2 volte al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allenare il rilascio attivo e consapevole del pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono, dispareunia, difficoltà di svuotamento vescicale o intestinale.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi su una sedia con i piedi appoggiati e le ginocchia divaricate.
2. Inspira e lascia scendere il perineo verso la seduta, in modo morbido.
3. Mantieni la sensazione di apertura per 3 secondi, senza spingere con l'addome.
4. Espira e lascia tornare il perineo nella posizione di riposo.
5. Riposa un respiro tra le ripetizioni.

4. PROGRESSIONE

Aumenta la durata del rilascio a 5 secondi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il reverse Kegel è un rilascio, non una spinta: l'addome resta morbido e non si deve trattenere il respiro.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.