MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 03

POSIZIONE DEL BAMBINO CON RESPIRAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta sui talloni, busto in avanti	8 a 10 respiri	1 o 2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare il pavimento pelvico posteriore e la zona lombare favorendo il rilassamento.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono del pavimento pelvico, dolore pelvico, tensione lombare.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in ginocchio e siedi verso i talloni.
2. Porta il busto in avanti e appoggia la fronte su un cuscino.
3. Allunga le braccia in avanti o portale lungo il corpo.
4. Inspira verso la schiena e il bacino, sentendo il perineo che si allarga.
5. Espira lentamente lasciando andare la tensione.

4. PROGRESSIONE

Mantieni più a lungo e aggiungi piccole oscillazioni laterali del bacino.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Divaricare le ginocchia aumenta l'apertura del bacino e rende più intenso l'allungamento perineale.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.