MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 06

ALLUNGAMENTO DEGLI ADDUTTORI A RANA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Quadrupedia, ginocchia divaricate	5 a 8 respiri	1 volta al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare gli adduttori e aprire il bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono del pavimento pelvico associato a rigidità degli adduttori.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in quadrupedia e allarga gradualmente le ginocchia.
2. Appoggia gli avambracci a terra.
3. Porta lentamente il bacino indietro fino a sentire l'allungamento.
4. Respira lasciando andare il perineo.
5. Torna avanti per uscire dalla posizione.

4. PROGRESSIONE

Aumenta gradualmente la distanza tra le ginocchia.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Metti dei cuscini sotto le ginocchia per ridurre la pressione articolare.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.