MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 07

CONTRAZIONE, RILASCIO E RILASCIO ULTERIORE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	6 ripetizioni	2 volte al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Migliorare la discriminazione tra i diversi livelli di tono del pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono, scarsa consapevolezza dello stato di riposo del perineo.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Contrai leggermente il pavimento pelvico, al 30 per cento.
3. Rilascia fino alla posizione di riposo.
4. Con un'inspirazione, lascia andare ancora di più, oltre il riposo.
5. Senti la differenza tra i tre livelli.

4. PROGRESSIONE

Esegui la sequenza seduta e poi in piedi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Molte pazienti con ipertono scoprono che il loro riposo è in realtà una contrazione: questo esercizio lo rende evidente.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.