
MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 09

ALLUNGAMENTO DEGLI ISCHIOCRURALI CON CINGHIA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina	30 secondi per lato, 2 volte	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Ridurre la tensione degli ischiocrurali che influenza la posizione del bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono con retroversione del bacino, dolore pelvico posteriore.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con una cinghia sotto la pianta di un piede.
2. Solleva la gamba mantenendo il ginocchio morbido.
3. Respira lentamente e lascia andare il perineo.
4. Mantieni l'allungamento leggero.
5. Cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Porta la gamba verso l'esterno per includere gli adduttori.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Ricorda alla paziente di non trattenere il respiro: l'apnea aumenta il tono del pavimento pelvico.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.