
MODULO VI · IPOTONO · ESERCIZIO 01

CONTRAZIONI RAPIDE DA SUPINA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 a 15 contrazioni rapide, 2 serie	2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Migliorare la reattività delle fibre rapide del pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipotono, debolezza del pavimento pelvico, incontinenza da sforzo.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Contrai il perineo velocemente e con forza.
3. Rilascia subito e completamente.
4. Ripeti con un ritmo di una contrazione al secondo.
5. Riposa un minuto tra le serie.

4. PROGRESSIONE

Esegui le contrazioni rapide da seduta e poi in piedi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La velocità non deve compromettere il rilascio: se la contrazione si sovrappone alla precedente, rallenta.

5. PRECAUZIONI

Il rinforzo va proposto dopo aver verificato una contrazione corretta, senza spinta verso il basso e con un rilascio completo. Aumentare il carico in modo graduale e interrompere in caso di dolore o sintomi di peso pelvico.