
MODULO VI · IPOTONO · ESERCIZIO 02

CONTRAZIONI SOSTENUTE CON RESPIRAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta	8 contrazioni da 8 a 10 secondi	2 volte al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Aumentare la resistenza del pavimento pelvico mantenendo una respirazione libera.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipotono, scarsa resistenza muscolare.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi con la schiena dritta e i piedi appoggiati.
2. Contrai il perineo al massimo comodo.
3. Mantieni la contrazione respirando normalmente.
4. Rilascia lentamente.
5. Riposa per lo stesso tempo della tenuta.

4. PROGRESSIONE

Aumenta la tenuta fino a 10 secondi e il numero di ripetizioni fino a 10.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Contare ad alta voce durante la tenuta impedisce l'apnea.

5. PRECAUZIONI

Il rinforzo va proposto dopo aver verificato una contrazione corretta, senza spinta verso il basso e con un rilascio completo. Aumentare il carico in modo graduale e interrompere in caso di dolore o sintomi di peso pelvico.