
MODULO VI · IPOTONO · ESERCIZIO 05

SQUAT CON ATTIVAZIONE PERINEALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
In piedi, con appoggio	10 ripetizioni	1 volta al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Rinforzare gli arti inferiori e il pavimento pelvico in un gesto funzionale.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipotono, debolezza degli arti inferiori, incontinenza da sforzo.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. In piedi davanti a una sedia, tieni lo schienale con le mani.
2. Inspirando, scendi spingendo il bacino indietro.
3. Mantieni le ginocchia in linea con i piedi.
4. Espirando, attiva il perineo e risali.
5. Esegui il movimento lentamente.

4. PROGRESSIONE

Esegui lo squat senza appoggio e poi con un carico leggero.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La sedia dà sicurezza e permette di concentrarsi sulla sincronizzazione tra respiro e perineo.

5. PRECAUZIONI

Il rinforzo va proposto dopo aver verificato una contrazione corretta, senza spinta verso il basso e con un rilascio completo. Aumentare il carico in modo graduale e interrompere in caso di dolore o sintomi di peso pelvico.