MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 01

RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA E GESTIONE DELLA PRESSIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 respiri	2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Insegnare a gestire la pressione addominale con il respiro.

2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso degli organi pelvici, sensazione di peso pelvico.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Inspira lentamente lasciando espandere addome e coste.
3. Espira attivando leggermente il perineo dal basso verso l'alto.
4. Mantieni l'addome morbido, senza spingere.
5. Prosegui con un ritmo lento.

4. PROGRESSIONE

Esegui la stessa respirazione in piedi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Spiega alla paziente che espirare durante gli sforzi riduce la pressione sugli organi pelvici.

5. PRECAUZIONI

Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.