MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 02

# CONTRAZIONI CON BACINO SOLLEVATO



| Posizione | Dosaggio | Frequenza | Livello |
|---|---|---|---|
| Supina, cuscino sotto il bacino | 8 lente e 10 rapide | 1 o 2 volte al giorno | Base |

## 1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allenare il pavimento pelvico con il supporto della gravità sugli organi pelvici.

## 2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso sintomatico, peso pelvico a fine giornata.

## 3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con un cuscino sotto il bacino.
2. Esegui una contrazione lenta e mantieni per 5 secondi.
3. Rilascia completamente.
4. Prosegui con le contrazioni rapide.
5. Rimani alcuni respiri in posizione prima di alzarti.

## 4. PROGRESSIONE

Passa alla posizione supina senza cuscino e poi seduta.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La posizione con bacino sollevato riduce i sintomi di peso ed è ideale per iniziare il programma.

## 5. PRECAUZIONI

*Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.*