MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 03

ESPIRAZIONE ATTIVA E CONTROLLO DELLA PRESSIONE ADDOMINALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 ripetizioni	2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Coordinare trasverso e pavimento pelvico durante l'espirazione.

2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso, debolezza del core.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Inspira lasciando espandere l'addome.
3. Espira come per spegnere una candela, attivando perineo e trasverso.
4. Mantieni l'attivazione per 5 secondi.
5. Rilascia e respira.

4. PROGRESSIONE

Esegui la sequenza mentre sollevi un braccio o una gamba.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il soffio a labbra socchiuse aiuta a regolare l'espirazione ed evita la spinta.

5. PRECAUZIONI

Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.