MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 05

QUADRUPEDIA CON CONTRAZIONE E RILASCIO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Quadrupedia	8 ripetizioni	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allenare il pavimento pelvico in una posizione con carico ridotto sugli organi.

2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso con sintomi di peso in stazione eretta.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in quadrupedia con la schiena neutra.
2. Espirando, solleva il perineo verso l'interno.
3. Mantieni 5 secondi.
4. Rilascia completamente.
5. Ripeti con un ritmo lento.

4. PROGRESSIONE

Aggiungi l'estensione di un braccio durante la tenuta.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> In quadrupedia gli organi pelvici si spostano verso l'addome: molte pazienti percepiscono meglio la contrazione.

5. PRECAUZIONI

Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.