MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 06

ABDUZIONE DELL'ANCA IN DECUBITO LATERALE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Decubito laterale	10 ripetizioni per lato	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Rinforzare il medio gluteo per la stabilità del bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso, debolezza glutea, instabilità del bacino.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati sul fianco con la gamba inferiore piegata.
2. Distendi la gamba superiore in linea con il corpo.
3. Espirando, attiva il perineo e solleva la gamba.
4. Scendi lentamente.
5. Cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Aggiungi una cavigliera leggera.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il bacino non deve ruotare all'indietro: è meglio un'ampiezza ridotta ma corretta.

5. PRECAUZIONI

Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.