
MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 10

POSTURA CORRETTA PER LA DEFECAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta, piedi rialzati	Ad ogni evacuazione	Quotidiano	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Ridurre la spinta durante la defecazione e proteggere il pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso, stipsi, defecazione ostruita.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi sul water con i piedi appoggiati su uno sgabello.
2. Inclina il busto in avanti con gli avambracci sulle cosce.
3. Rilassa l'addome e il perineo.
4. Espira lentamente con le labbra socchiuse, senza spingere con forza.
5. Non trattenere il respiro.

4. PROGRESSIONE

Associa una corretta idratazione e un'alimentazione ricca di fibre.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> L'altezza dello sgabello deve portare le ginocchia sopra le anche: questo raddrizza l'angolo anorettale.

5. PRECAUZIONI

Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.