
MODULO VII · PROLASSO · ESERCIZIO 11

CONTRAZIONI IN STAZIONE ERETTA DURANTE LE ATTIVITÀ



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
In piedi	5 contrazioni lente	Più volte al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Integrare il sostegno del pavimento pelvico nelle attività quotidiane.

2. INDICAZIONE CLINICA

Prolasso, fase di mantenimento.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. In piedi con il peso distribuito sui due piedi.
2. Esegui una contrazione lenta e mantieni.
3. Rilascia completamente.
4. Ripeti durante le attività quotidiane.
5. Prima di sforzi prolungati, attiva il perineo.

4. PROGRESSIONE

Esegui le contrazioni durante il cammino.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Pianifica momenti di riposo in posizione supina durante la giornata se i sintomi di peso aumentano la sera.

5. PRECAUZIONI

Il prolasso deve essere valutato dal medico specialista. Evitare la manovra di Valsalva, i carichi elevati senza strategia respiratoria e la stipsi. Se i sintomi di peso aumentano durante un esercizio, interromperlo e passare a una posizione con meno carico.