MODULO VIII · DISFUNZIONI SESSUALI · ESERCIZIO 01

RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA CON CONSAPEVOLEZZA DEL PERINEO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 respiri	1 o 2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Migliorare la consapevolezza corporea e ridurre la tensione.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dispareunia, vaginismo, difficoltà di eccitazione, ansia da prestazione.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Porta l'attenzione al respiro e al bacino.
3. Inspira e senti il perineo che si allarga.
4. Espira e senti il perineo che torna a riposo.
5. Prosegui con un ritmo lento.

4. PROGRESSIONE

Esegui la respirazione da seduta.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> La consapevolezza precede ogni altro lavoro: senza percezione del perineo è difficile modularne il tono.

5. PRECAUZIONI

Le disfunzioni sessuali hanno spesso cause multifattoriali: valutare la collaborazione con ginecologo, sessuologo o psicologo. Gli esercizi vanno proposti con un linguaggio rispettoso e senza dolore. In caso di storie di violenza, procedere con particolare cautela e consenso.