
MODULO VIII · DISFUNZIONI SESSUALI · ESERCIZIO 02

CONTRAZIONE E RILASCIO PER LA CONSAPEVOLEZZA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta	8 ripetizioni	1 o 2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Distinguere contrazione e rilascio del pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Difficoltà di eccitazione, anorgasmia, scarsa consapevolezza perineale.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi con i piedi appoggiati.
2. Contrai lentamente il perineo.
3. Mantieni 3 secondi.
4. Rilascia lentamente, più a lungo della contrazione.
5. Riposa un respiro.

4. PROGRESSIONE

Aumenta la tenuta a 5 secondi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il rilascio lento e prolungato è la parte più importante quando c'è tensione o dolore.

5. PRECAUZIONI

Le disfunzioni sessuali hanno spesso cause multifattoriali: valutare la collaborazione con ginecologo, sessuologo o psicologo. Gli esercizi vanno proposti con un linguaggio rispettoso e senza dolore. In caso di storie di violenza, procedere con particolare cautela e consenso.