
MODULO VIII · DISFUNZIONI SESSUALI · ESERCIZIO 09

ALLUNGAMENTO DELL'INTERNO COSCIA DA SEDUTA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta, gambe divaricate	30 secondi, 2 volte	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare gli adduttori e favorire l'apertura del bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dispareunia, ipertono, rigidità degli adduttori.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi con le gambe divaricate.
2. Porta il busto in avanti con la schiena lunga.
3. Respira lentamente.
4. Mantieni l'allungamento leggero.
5. Torna lentamente.

4. PROGRESSIONE

Aumenta gradualmente l'apertura.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Siediti su un cuscino per facilitare la posizione del bacino.

5. PRECAUZIONI

Le disfunzioni sessuali hanno spesso cause multifattoriali: valutare la collaborazione con ginecologo, sessuologo o psicologo. Gli esercizi vanno proposti con un linguaggio rispettoso e senza dolore. In caso di storie di violenza, procedere con particolare cautela e consenso.