

Рак яєчок та простати: що має знати кожен чоловік

Рак яєчок і рак простати належать до найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків. Попри те, що часто можна почути “мене це не стосується”, статистика свідчить про протилежне: злоякісні пухлини чоловічих репродуктивних органів вражають як чоловіків у продуктивному віці, так і у старшому, а вчасне виявлення буквально рятує життя.

Саме тому в рамках Movember ми зосереджуємося на просвітницькій діяльності — щоб чоловіки знали, як піклуватися про своє здоров'я і коли звертатися до лікаря.

Рак яєчок: найпоширеніше онкологічне захворювання серед молодих чоловіків

Рак яєчок найчастіше виникає у чоловіків віком **15-40 років**. Доброю новиною є те, що при своєчасному виявленні він має дуже високі шанси на повне виліковування.

Як розпізнати проблему

Попереджувальними ознаками можуть бути:

- тверда або безболісна гуля на яєчку,
- зміна форми або розміру яєчка,
- відчуття тягаря у мошонці,
- біль або неприємний тиск у нижній частині живота чи паху.

Найважливішою профілактикою є **регулярне самообстеження**. Найкраще проводити його **раз на місяць під теплим душем**, коли шкіра розслаблена.

Якщо чоловік відчуває ущільнення, зміну розміру чи болючість, він повинен якнайшвидше звернутися до уролога.

Важливою частиною профілактики є також здоровий спосіб життя, обмеження вживання алкоголю та куріння, а також захист від перегрівання яєчок.

Самообстеження яєчок



Перевіряйте свої яєчка щонайменше один раз на місяць



Проводьте самообстеження найкраще під час душу, коли шкіра розслаблена.



Намильте тіло



Перевіряйте завжди одне яєчко окремо — не обидва одночасно



Обережно перекошуйте яєчко між пальцями.



Пальпуйте насіннєвий канатик ззаду яєчка.



Шукайте тверді вузлики, гладкі або округлі утворення



... зміни розміру, форми або консистенції ...



... або будь-які болючі ділянки

Рак простати: найпоширеніше онкологічне захворювання чоловіків у Чехії

Рак простати зазвичай виникає у чоловіків старше 50 років, і, на жаль, останнім часом спостерігається помітне зростання кількості таких випадків. Ризик зростає з віком або при наявності захворювання в родині.

Можливі симптоми включають:

- часте сечовипускання,
- слабкий струмінь сечі,
- ускладнене сечовипускання,
- кров у сечі або спермі,
- біль у спині чи тазу.

Однак якщо пухлина не росте безпосередньо біля сечівника і не тисне на нього, на початкових стадіях вона може не викликати жодних симптомів. Саме тому профілактика є ключовою.

Простата розташована глибоко в малому тазу, тож її неможливо обстежити самотійно. Надійною профілактикою є:

- **PSA-тест** (аналіз крові) з 50 років.
- ректальне обстеження (обстеження простати пальцем через пряму кишку).

Урологічні огляди рекомендуються з **45 років**, а при наявності раку простати в родині — вже з 40 років.

Лікарі також радять як профілактику здоровий спосіб життя, обмеження вживання алкоголю та куріння, а також регулярну фізичну активність.