

WRH-6-Solutions

14.5: 2, 13

14.6: 4, 12

14.7: 5, 19

14.8: 4

14.5

② $z = \frac{x-y}{x+2y}$, $x = e^{\pi t}$, $y = e^{-\pi t}$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} =$$

$$= \frac{(x+2y) \cdot 1 - (x-y) \cdot 1}{(x+2y)^2} \pi e^{\pi t} + \frac{(x+2y)(-1) - (x-y) \cdot 2}{(x+2y)^2} (-\pi) e^{-\pi t}$$

$$= \frac{3y}{(x+2y)^2} \pi e^{\pi t} + \frac{-3x}{(x+2y)^2} (-\pi e^{\pi t}) =$$

$$= \frac{3\pi}{(x+2y)^2} (ye^{\pi t} + xe^{\pi t})$$

⑬

$$p(t) = f(g(t), h(t))$$

f is differ.

$$g(2) = 4, \quad g'(2) = -3$$

$$h(2) = 5, \quad h'(2) = 6$$

$$f_x(4,5) = 2, \quad f_y(4,5) = 8$$

$$p'(t) = f_x \cdot \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}$$

When $t = 2$: $x = g(2) = 4$
 $y = h(2) = 5$

So, $p'(2) = f_x(4,5)g'(2) + f_y(4,5)h'(2) =$
 $= 2 \cdot (-3) + 8 \cdot 6 = \boxed{42}$

14.6

④ $f(x,y) = xy^3 - x^2$, $(1,2)$, $\theta = \frac{\pi}{3}$

$$D_u f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \cos \theta + f_y(x_0, y_0) \sin \theta$$

$$f_x(x,y) = y^3 - 2x$$

$$f_y(x,y) = 3xy^2$$

$$f_x(1,2) = 8 - 2 = 6$$

$$f_y(1,2) = 3 \cdot 4 = 12$$

$$D_u f(1,2) = 6 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 12 \sin \frac{\pi}{3} = 6 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =$$

$$= \boxed{3 + 6\sqrt{3}}$$

⑫

$$f(x,y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$
, $(1,2)$, $v = \langle 3, 5 \rangle$

$$D_u f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) u_1 + f_y(x_0, y_0) u_2$$

$$f_x(x,y) = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_y(x,y) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_x(1,2) = \frac{-1 + 4}{(1 + 4)^2} = \frac{3}{25}$$

$$f_y(1,2) = \frac{-2 \cdot 2}{25} = -\frac{4}{25}$$

$$u = \frac{v}{|v|} = \left\langle \frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}} \right\rangle$$

$$D_u f(1,2) = \frac{3}{25} \cdot \frac{3}{\sqrt{34}} - \frac{20}{25 \cdot \sqrt{34}} = \frac{-11}{25\sqrt{34}} \quad \blacktriangledown$$

14.7

$$(5) \quad f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + y$$

SOT:

$$f_x(x,y) = 2x + y = 0$$

$$f_y(x,y) = x + 2y + 1 = 0$$

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + 2y + 1 = 0 \quad | \cdot 2 \end{cases}$$

$$y - 4y - 2 = 0$$

$$-3y = 2$$

$$y = -\frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Hence, $(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$ is a critical point.

$$D = f_{xx}(a,b) f_{yy}(a,b) - (f_{xy}(a,b))^2$$

$$f_{xx} = 2$$

$$f_{yy} = 2$$

$$f_{xy} = 1$$

$$D = 2 \cdot 2 - 1 = 3 > 0 \text{ for all } (x,y) \in \text{Dom}(f)$$

Since $D > 0$ and $f_{xx} > 0$, then

$f(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$ is a loc. min and

$$f(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}) = -\frac{1}{3}.$$




⑩ $f(x,y) = y^2 - 2y \cos x$

$$-1 \leq x \leq \pi$$

$$\begin{cases} f_x = 2y \sin x = 0 \\ f_y = 2y - 2 \cos x = 0 \end{cases}$$

$$y = \cos x$$

$$2 \cos x \sin x = 0$$



$$f_x = 0 \Rightarrow y=0 \text{ or } x=0, \pi, 2\pi$$

If $y=0$, then $f_y: \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

If $x=0, 2\pi$, then

$$f_y: 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = 1$$

If $x = \pi$, then

$$f_y: 2y + 2 = 0 \Rightarrow y = -1$$

Critical points: $(\frac{\pi}{2}, 0), (\frac{3\pi}{2}, 0), (0, 1), (2\pi, 1), (\pi, -1)$

$$f_{xx} = 2y \cos x$$

$$f_{yy} = 2 + 2\sin x$$

$$f_{xy} = 2 \sin x$$

$$D = 2y \cos x \cdot (2 + 2\sin x) - 4\sin^2 x = 4(y \cos x - \sin^2 x)$$

$$D(\frac{\pi}{2}, 0) = -4 < 0$$

$$D(\frac{3\pi}{2}, 0) = -4 < 0$$

$$D(0, 1) = 4 > 0$$

$$D(2\pi, 1) = 4 > 0$$

$$D(\pi, -1) = 4 > 0$$

$$f_{xx}(0, 1) = 2 > 0$$

$$f_{xx}(2\pi, 1) = 2 > 0$$

$$f_{xx}(\pi, -1) = 2 > 0$$

Hence, $f(0,1), f(2\pi,1), f(\pi,-1)$ are loc. min
and $f(0,1) = f(2\pi,1) = f(\pi,-1) = -1$.

Since $D(\frac{\pi}{2},0) < 0$ and $D(\frac{3\pi}{2},0) < 0$, then
 $(\frac{\pi}{2},0)$ and $(\frac{3\pi}{2},0)$ are saddle points.

14.8

④

$$f(x,y) = 3x + y$$

$$x^2 + y^2 = 10$$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = c \end{cases}$$

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle 3, 1 \rangle$$

$$\nabla g = \langle g_x, g_y \rangle = \langle 2x, 2y \rangle$$

$$\begin{cases} 3 = \lambda \cdot 2x \\ 1 = \lambda \cdot 2y \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

$$x = \frac{3}{2\lambda} \Rightarrow x \neq 0$$

$$y = \frac{1}{2\lambda} \Rightarrow y \neq 0$$

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 10$$

$$\frac{10}{4\lambda^2} = 10 \Rightarrow 4\lambda^2 = 1$$

$$\lambda = \pm \frac{1}{2}$$

If $\lambda = \frac{1}{2}$: $x = 3$
 $y = 1$ $(3, 1)$

If $\lambda = -\frac{1}{2}$: $x = -3$
 $y = -1$ $(-3, -1)$

Possible extreme values at points : $(3, 1)$ and $(-3, -1)$.

$$f(3, 1) = 10$$

$$f(-3, -1) = -10$$

Thus $f_{\max} = 10$ on $x^2 + y^2 = 10$
 $f_{\min} = -10$ on $x^2 + y^2 = 10$.

