## La flecha del tiempo en cosmología

Olimpia Lombardi

CONICET – Universidad de Buenos Aires

Encuentro mensual del proyecto

The cosmological origin of the arrow of time

Buenos Aires, 7 de abril de 2021








### Introducción

En cosmología, suele denominarse "flecha cosmológica del tiempo" al sentido temporal de expansión del universo: dicha flecha será global en un universo Big Bang-Big Chill, pero apuntará en distintos sentidos en un universo Big Bang-Big Crunch. Esta terminología privilegia el "radio" del universo frente a otras propiedades geométricas del espacio-tiempo. Pero, ¿por qué aceptar el carácter privilegiado del radio respecto de otras propiedades geométricas del universo?

Por otra parte, las discusiones tradicionales acerca de la flecha del tiempo suelen involucrar el concepto de entropía: el sentido pasado-a-futuro se relaciona con el gradiente de la función entropía del universo. Sin embargo, la entropía es una magnitud macroscópica, compatible con múltiples configuraciones del sistema. Aquí la pregunta se refiere a la posibilidad de definir una flecha del tiempo para el universo en su conjunto sobre conceptos más básicos que la entropía.

En este trabajo denominaremos "flecha del tiempo cosmológica" a la flecha definida exclusivamente sobre la base de las propiedades geométricas del espacio-tiempo. A su vez, argumentaremos que, si se cumplen ciertas condiciones, es posible definir la flecha cosmológica del tiempo.



### Origen del problema de la flecha del tiempo

Hecho → experimentamos una asimetría temporal entre pasado y futuro

Problema → encontrar un correlato físico de tal asimetría

### ¿Cómo entender el problema de la Flecha del Tiempo?

Por analogía con una flecha:



Problema: cómo distinguir entre los dos sentidos del tiempo sobre la base de las propiedades del espacio-tiempo y en términos exclusivamente físicos.

# Consideremos, por ejemplo, la pirámide de Keops

Para el cosmólogo, el universo es un objeto cuatridimensional que puede ser:

o a lo largo de la dimensión temporal asimétrico

Problema:

Construir un modelo de universo asimétrico a lo largo de la dimensión temporal, de modo tal que su asimetría permita distinguir entre los dos sentidos temporales.

### Condiciones para definir la Flecha del Tiempo Cosmológica


- 1°) El espacio-tiempo debe ser temporalmente orientable
- 2°) El espacio-tiempo debe admitir la definición de un tiempo cósmico
- 3°) Debe ser posible formular un modelo asimétrico mediante leyes no t-invariantes
- 4°) Debe rechazarse la prioridad ontológica del espacio-tiempo respecto del universo

# Orientabilidad temporal Espacio-tiempo temporalmente orientable: puede definirse un campo vectorial continuo, cuyos vectores son tipo tiempo respecto de su métrica.

### Orientabilidad temporal

Espacio-tiempo temporalmente orientable: puede definirse un campo vectorial continuo, cuyos vectores son tipo tiempo respecto de su métrica.


Si el espacio-tiempo es temporalmente no-orientable, puede convertirse un vector "temporal" que apunta hacia el futuro en un vector "temporal" que apunta hacia el pasado por medio de una transformación continua.




### Orientabilidad temporal

Espacio-tiempo temporalmente orientable: puede definirse un campo vectorial continuo, cuyos vectores son tipo tiempo respecto de su métrica.

Si el espacio-tiempo es temporalmente no-orientable, puede convertirse un vector "temporal" que apunta hacia el futuro en un vector "temporal" que apunta hacia el pasado por medio de una transformación continua.







### Orientabilidad temporal

Espacio-tiempo temporalmente orientable: puede definirse un campo vectorial continuo, cuyos vectores son tipo tiempo respecto de su métrica.

Si el espacio-tiempo es temporalmente no-orientable, puede convertirse un vector "temporal" que apunta hacia el futuro en un vector "temporal" que apunta hacia el pasado por medio de una transformación continua.





Si el espacio-tiempo es no-orientable, la distinción entre los dos sentidos temporales no puede establecerse a nivel global.

### Tiempo cósmico Tiempo propio de una partícula: tiempo que mide un reloj solidario con la partícula No siempre es posible sincronizar los tiempos propios de todas las partículas del universo Condiciones: a) El espacio-tiempo debe ser foliable en hipersuperficies tipo-espacio ordenables según una función monótona creciente (impide curvas temporales cerradas)


### Tiempo cósmico

Tiempo propio de una partícula: tiempo que mide un reloj solidario con la partícula

No siempre es posible sincronizar los tiempos propios de todas las particulas del universo

### Condiciones:

- a) El espacio-tiempo debe ser foliable en hipersuperficies tipo-espacio ordenables según una función monótona creciente (impide curvas temporales cerradas)
- b) La noción de simultaneidad debe ser unívoca y recobrar la noción de la Teoría Especial (las líneas de mundo deben ser ortogonales a las hipersuperficies tipo espacio)




### Tiempo cósmico

Tiempo propio de una partícula: tiempo que mide un reloj solidario con la partícula


No siempre es posible sincronizar los tiempos propios de todas las particulas del universo

### Condiciones:

- a) El espacio-tiempo debe ser foliable en hipersuperficies tipo-espacio ordenables según una función monótona creciente (impide curvas temporales cerradas)
- b) La noción de simultaneidad debe ser unívoca y recobrar la noción de la Teoría Especial (las líneas de mundo deben ser ortogonales a las hipersuperficies tipo espacio)



c) El tiempo propio entre dos hipersuperficies de simultaneidad debe ser el mismo para todas las líneas de mundo.



a) La pregunta acerca de la posibilidad

¿Cómo es posible describir un universo temporalmente asimétrico mediante leyes t-invariantes?

Una evolución  $S_1 \to S_1$  es dinámicamente posible respecto de una ley L si es consistente con L, es decir, si es una solución de L.

Sea T(S) el estado temporalmente invertido respecto de S.

La ley L es t-invariante cuando se cumple: la evolución  $S_l \to S_j$  es dinámicamente posible respecto de L sii su evolución invertida  $\mathbf{T}(S_j) \to \mathbf{T}(S_l)$  es también dinámicamente posible respecto de L

### Universos Asimétricos

a) La pregunta acerca de la posibilidad

¿Cómo es posible describir un universo temporalmente asimétrico mediante leyes t-invariantes?

Una evolución  $S_1 \to S_1$  es dinámicamente posible respecto de una ley L si es consistente con L, es decir, si es una solución de L.

Sea T(S) el estado temporalmente invertido respecto de S.

La ley L es t-invariante cuando se cumple: la evolución  $S_l \to S_j$  es dinámicamente posible respecto de L sii su evolución invertida  $\mathbf{T}(S_j) \to \mathbf{T}(S_l)$  es también dinámicamente posible respecto de L

t-invariancia → propiedad de leyes (ecuaciones)

t-simetría → propiedad de modelos (soluciones)

Por lo tanto, nada impide obtener modelos asimétricos mediante leyes t-invariantes.

### Universos Asimétricos

a) La pregunta acerca de la posibilidad

¿Cómo es posible describir un universo temporalmente asimétrico mediante leyes t-invariantes?

Una evolución  $S_1 \to S_1$  es dinámicamente posible respecto de una ley L si es consistente con L, es decir, si es una solución de L.

Sea T(S) el estado temporalmente invertido respecto de S.

La ley L es t-invariante cuando se cumple: la evolución  $S_l \to S_j$  es dinámicamente posible respecto de L sil su evolución invertida  $\mathbf{T}(S_j) \to \mathbf{T}(S_l)$  es también dinámicamente posible respecto de L


t-invariancia → propiedad de leyes (ecuaciones)

t-simetría -> propiedad de modelos (soluciones)

Por lo tanto, nada impide obtener modelos asimétricos mediante leyes t-invariantes.

Un espacio-tiempo orientable *M* es *t-isótropo* si existe un difeomorfismo *d* de *M* sobre sí mismo que invierte las orientaciones temporales pero preserva la métrica.

Un espacio-tiempo orientable M es t-simétrico respecto de una hipersuperficie tipo espacio t= $\alpha$ , donde  $\alpha$  es una constante, si es t-isótropo y el difeomorfismo d deja fija la hipersuperficie t= $\alpha$  (la hipersuperficie t= $\alpha$  divide al espacio-tiempo en dos "mitades" especularmente simétricas)



### El status ontológico del tiempo

- La t-invariancia de las leyes no es un obstáculo para describir un modelo t-asimétrico de universo.
- Pero si m es modelo, T(m) (el modelo especularmente simétrico respecto de m) también lo es.

¿Cómo elegir entre dos universos nomológicamente posibles, uno la imagen especular del otro?

- Si se tratara de un sistema inmerso en un entorno, la pregunta tiene sentido.
- ¿Pero qué sentido tiene para el universo como un todo?

La idea misma de dos universos "temporalmente opuestos" presupone un tiempo común a ambos universos → Incompatible con la interpretación standard de la Relatividad General.

Dos modelos de universo (M, g) y (M', g') se consideran equivalentes si son isométricos, es decir, si existe un difeomorfismo  $\theta$ :  $M \to M'$  que convierte la métrica g en la métrica g'.

Las transformaciones de simetría (en particular, la inversión temporal) son isometrías.

Por lo tanto, m y T(m) son descripciones distintas pero equivalentes de un mismo universo posible

### Esta tesis de equivalencia:

- Sólo requiere negar la prioridad ontológica del espacio-tiempo respecto del "contenido" del universo.
- Es independiente de la t-invariancia de las leyes:

 $L: \alpha = kt \implies L^* = T(L): \alpha = -kt \rightarrow El$  problema de decidir entre m y T(m) se convierte en el problema de decidir entre L y L\* cuál es "verdadera"

Requiere apelar a nuestra percepción del tiempo

L y L\* son leyes equivalentes que describen la misma situación física global

# La relevancia de la t-invariancia de las leyes Diferencia entre: • "Problema de la simetría": cómo formular un modelo t-asimétrico mediante leyes t-invariantes. • "Problema de la elección": cómo elegir entre dos modelos especularmente simétricos entre sí.

### La relevancia de la t-invariancia de las leyes

### Diferencia entre:

- "Problema de la simetría": cómo formular un modelo t-asimétrico mediante leyes t-invariantes.
- "Problema de la elección": cómo elegir entre dos modelos especularmente simétricos entre sí.

Para ninguno de ambos problemas es relevante la t-invariancia de las leyes:

- "Problema de la simetría": la t-invariancia no es obstáculo para formular modelos t-asimétricos.
- "Problema de la elección": surge tanto con leyes t-invariantes como con leyes no t-invariantes y se resuelve apelando a la tesis de equivalencia en ambos casos.

### La relevancia de la t-invariancia de las leyes

### Diferencia entre:

- "Problema de la simetría": cómo formular un modelo t-asimétrico mediante leyes t-invariantes.
- "Problema de la elección": cómo elegir entre dos modelos especularmente simétricos entre sí.

Para ninguno de ambos problemas es relevante la t-invariancia de las leyes:

- "Problema de la simetría": la t-invariancia no es obstáculo para formular modelos t-asimétricos.
- "Problema de la elección": surge tanto con leyes t-invariantes como con leyes no t-invariantes y se resuelve apelando a la tesis de equivalencia en ambos casos.

### Conclusión:

A diferencia de lo que tradicionalmente se supone, la t-invariancia de las leyes no es relevante para el problema de la flecha cosmológica del tiempo.

El problema requiere concentrar la atención en las propiedades de los *modelos* y no de las leyes

### Consideraciones finales

- La flecha del tiempo cosmológica no es una consecuencia inevitable de las leyes físicas: es una propiedad contingente del espacio-tiempo.
- Los modelos cosmológicos standard de la cosmología contemporánea cumplen las condiciones necesarias para posee una flecha cosmológica del tiempo con alta probabilidad.
- El carácter contingente de la flecha cosmológica del tiempo no minimiza su carácter objetivo.

## La flecha del tiempo en cosmología

¡Muchas gracias!

Encuentro mensual del proyecto

The cosmological origin of the arrow of time

Buenos Aires, 7 de abril de 2021





