

Paciente: JHONATAN MARQUEZ LEON
Género: Masculino
Edad: 36 años, 8 meses y 13 días
Teléfono: 72986859

Médico: Dr. DANILO JURADO VALLEJOS
Fecha Recepción: 19/06/2026 07:45:14
Fecha Reporte: 21/06/2026 00:01:49
No. Orden: 06192026-111

ENDOCRINOLOGÍA**TESTOSTERONA LIBRE**

Tipo de Muestra: SUERO

ANÁLISIS	RESULTADO
TESTOSTERONA LIBRE	0.50 ng/dL
	Valores de referencia
	Hombres
	17 y 40 años 3,0 - 25,0
	41 y 60 años 2,7 - 18,0
	> 60 años 1,9 - 19,0

TESTOSTERONA TOTAL

Tipo de Muestra: SUERO

ANÁLISIS	RESULTADO	RANGO REFERENCIAL
TESTOSTERONA TOTAL	0.90 ng/mL	2.49 - 8.36 ng/mL
	Hombres	
	Prepúber: 0,1 - 0,2	
	20 a 49 años: 2,49 - 8,36	
	≥ 50 años: 1,93 - 7,40	
	Mujeres	
	50 años: 0,08 - 0,48	
	> 50 años: 0,02 - 0,40	

Verificado por: Ximena

—

ATENTAMENTE


Marisol Velasquez Tito
BIOQUÍMICA
MAT. PROF. V - 1140

v-1140

Marisol Velasquez Tito
Bioquímica Especialista en
Endocrinología

RPR

Tipo de Muestra: SUERO

Método: Aglutinación

ANÁLISIS	RESULTADO
RPR	No Reactivo

HERPES SIMPLE TIPO 2 IGM/IGG

Tipo de Muestra: SUERO

Método: Inmunoensayo enzimático (ELISA)

ANÁLISIS	RESULTADO	RANGO REFERENCIAL
ANTICUERPOS ANTI HERPES TIPO 2 IgM	1.2 UA/mL	0 - 11 UA/mL
Conclusion	Prueba Negativa	
Interpretación:	- Negativo: 9,0 - Dudoso: 9 a 11 - Positivo: > 11	
ANTICUERPOS ANTI HERPES TIPO 2 IgG	4.0 UA/mL	0 - 11 UA/mL
Conclusion	Prueba Negativa	
Interpretación:	- Negativo: 9,0 - Dudoso: 9 a 11 - Positivo: > 11	
Nota:	Los resultados deben ser valorados junto con la sintomatología clínica. La prueba no indica el lugar de la infección. Las muestras recogidas al principio de la infección pueden no tener niveles detectables de anticuerpos esos casos se recomienda obtener una segunda muestra transcurrido entre 14 y 21 días.	

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM/IgG

Tipo de Muestra: SUERO

Método: Inmunoensayo enzimático (ELISA)

ANÁLISIS	RESULTADO
Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis IgM	14.6
Conclusion	Prueba Positiva
Interpretación:	• Negativo: 9,0 • Dudoso: 9 a 11 • Positivo: > 11
Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis IgG	10.4
Conclusion	Prueba Indeterminada
Interpretación:	• Negativo: 9,0 • Dudoso: 9 a 11 • Positivo: > 11
Nota:	Los resultados deben ser valorados junto con la sintomatología clínica. La prueba no indica el lugar de la infección. Las muestras recogidas al principio de la infección pueden no tener niveles detectables de anticuerpos esos casos se recomienda obtener una segunda muestra transcurrido entre 14 y 21 días.

Verificado por: Ximena

—

ATENTAMENTE



BIOQUÍMICA
MAT. PROF. V - 1140

v-1140

Marisol Velasquez Tito
Bioquímica Especialista en
Endocrinología

Paciente: JHONATAN MARQUEZ LEON

No. Orden: 06192026-111

Dirección: C/Méndez entre Av. Las Américas y C.
Avaroa

Celular: 68724938
Tarija - Bolivia

Correo: quantumlaboratorio26@gmail.com

EXAMEN GENERAL DE ORINA

Tipo de Muestra: ORINA

Método: Manual microscópico

EXAMEN FISICO

ANÁLISIS	RESULTADO
Volumen	55 ml
Color	Amarillo
Olor	Sui géneris
Aspecto	Límpido
Sedimento	Escaso
pH	6.0 Ácida
Densidad	1020

EXAMEN QUIMICO

ANÁLISIS	RESULTADO
Proteínas	No contiene
Glucosa	No contiene
Cetonas	No contiene
Urobilínógeno	Normal
Bilirrubina:	No contiene
Sangre	No contiene
Nitritos	Negativo
Esterasa leu.	No contiene


EXAMEN MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO

ANÁLISIS	RESULTADO
Células epiteliales	Escasas
Leucocitos	0 a 3 p.c.m.
Hematíes	0 a 1 p.c.m.
Bacterias	Escasas

Verificado por: Marisol

—

ATENTAMENTE


D^a. Ximena Ortega Rueda
BIOQUIMICA
MAT. PROF. O- 10699227O-10699227
Ximena Ortega Rueda
Bioquímica