



EFFETS DU TRAITEMENT MON TRAITEMENT PAR ANTICOAGULANT ORAL DIRECT (AOD)

JE CONNAIS LES SIGNES DE SUR ET SOUS-DOSAGE

ON PREND
SOIN
DE VOUS !

> Signes de surdosage : RISQUE HÉMORRAGIQUE.

Apparition d'un saignement, même s'il semble mineur :

- Saignement des gencives, du nez ou œil rouge (hémorragie conjonctivale),
- Présence de sang dans les urines, présence de sang rouge dans les selles ou selles noires,
- Règles anormalement abondantes,
- Apparition de « bleus » (hématomes) sans cause évidente,
- Vomissements ou crachats sanglants,
- Saignement qui ne s'arrête pas.

Apparition de signes pouvant évoquer un saignement interne non visible :

- Fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, malaise inexpliqué.
- Pâleur inhabituelle,
- Mal de tête ne cédant pas au traitement.



EN CAS D'APPARITION
D'UN DE CES SYMPTÔMES,
CONTACTEZ LE 15

> Signes de sous-dosage : RISQUE DE FORMATION DE CAILLOTS ET DONC DE SURVENUE D'AVC, DE PHLÉBITE OU D'EMBOLIE PULMONAIRE.

- **Signes d'AVC** : troubles de la parole ou de la vision, déformation de la bouche, paralysie d'un côté du corps ou d'un membre, mal de tête violent et persistant.
- **Signes de thrombose veineuse** : œdème d'une cuisse, d'une jambe ou seulement d'un mollet, douleur unilatérale avec ou sans œdème.
- **Signes d'embolie pulmonaire** : essoufflement soudain, douleur thoracique, crachat sanglant.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Les anticoagulants oraux directs (AOD) présentent de nombreuses interactions médicamenteuses.
Pour votre sécurité, respectez ces consignes :

ZÉRO AUTOMÉDICATION :

Ne prenez **JAMAIS** de nouveau traitement (même pour une douleur banale ou un rhume) sans l'avis préalable de votre médecin ou de votre pharmacien.

VIGILANCE MÉDICALE :

Toute nouvelle infection ou douleur doit faire l'objet d'une consultation.

